

Ziverell®

Närästyksen hoitoon



Yksi annospussi jokaisen aterian jälkeen ja ennen nukkumaanmenoa tai terveydenhuollon ammattilaisen antamien ohjeiden mukaisesti. Suositeltu päiväannos maksimissaan 4 pussia.

ZIVEREL® helpottaa närästysoireita 30 minuutissa.¹

ZIVEREL® on miellyttävän viinirypäleen makuinen oraalliliuos. Pakkauksessa on 20 x 10 ml:n annospussia otettavaksi suun kautta.



Apteekista

ZIVEREL®-liuos on tarkoitettu nieltäväksi **KÄYTTÖAIHEET:** Ruokatorven limakalvon suojaavaan hoitoon. Helpottaa limakalvon parantumista ja lievittää oireita, kuten polttelua ja kipua. ZIVEREL® on lääkinnällinen tarve, joka tarjoaa nopean lievityksen ruokatorven refluksitaudin oireisiin, kuten närästyksen, ylävatsan kipuihin, hapon nousemiseen ruokatorveen, ärästytykskään ja äänihäiriöihin. Ruokatorven refluksitauti (GERD) on yleisin ruokatorven limakalvosairaus. GERD:lle tunnusomaisia ovat tietyt oireet (kuten närästys, hapon nouseminen ruokatorveen, ärästytykskään ja äänihäiriöt), jotka voivat iämetä yhdessä ruokatorven limakalvon erosiivisten tulehdusvaurioiden kanssa. Refluksitauti tavallisesti pahenee makuulla, joten oireet saattavat tuntua voimakkaammin öisin. ZIVEREL® on hyaluronihapon ja kondroitiinisulfaatin yhdistelmä, jotka yhdessä tarjoavat mekanismin ruokatorven limakalvon suojaamiseen ja sen parantumisen edistämiseen. Limakalvolle hyvin kiinnittyvän eli bioadheesivisen ainesosan (poloksameeri 407) ansiosta ZIVEREL® valmistee mahdollistaa hyaluronihapon ja kondroitiinisulfaatin pysymisen ruokatorven seinämässä ja vaikuttaa osaltaan suojaavasti vatsan erittämän suolahapon ja pepsiniin vaikutuksia vastaan. Kondroitiinisulfaattilla on myös ruokatorven limakalvojen paranemisprosessia edistävä vaikutus. **KOOSTUMUS/AINESOSAT:** Hyaluronihapon natriumsuola, natriumkondroitiinisulfaatti, polyvinylpyrrolidoni, ksylitol C, natriumbentsoaatti, kaliumsorbaatti, aromi, vesi ja poloksameeri 407. **PAKKAUS:** 20 kpl 10 ml:n annospussia otettavaksi suun kautta. **ANNOSTUS JA KÄYTTÖOHJEET:** Ota yhden annospussin sisältö jokaisen aterian jälkeen ja ennen nukkumaanmenoa tai terveydenhuollon ammattilaisen antamien ohjeiden mukaisesti. **VASTA-AIHEET:** Erityisiä vasta-aiheita ei ole. Jos olet herkistynyt jollekin tuotteen ainesosalle, lopeta tuotteen käyttö ja ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen. Vaikka tunnettuja haittavaikutuksia ei ole, tätä tuotetta ei tule käyttää raskauden aikana tai ensimmäisten imetykskuukausien aikana. On aina suositeltavaa keskustella aiheesta terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ennen käyttöä. **VAROITUKSET:** Älä ylitä suositeltua annosta. Jos oireet pitkittyvät, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen. Älä käytä tuotetta pakkauskassa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Säilytä tuote viileässä, kuivassa paikassa. Älä säilytä lämmönlähteiden läheisyydessä. Älä pakasta. Säilytä tuote poissa lasten näkyviltä ja ulottuvilta.

LÄHTEET: 1. Palmieri B, et al. Fixed combination of hyaluronic acid and chondroitin-sulphate oral formulation in a randomized double blind, placebo controlled study for the treatment of symptoms in patients with non-erosive gastroesophageal reflux. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2013;17:3272-78. 2. Savarino V, et al. Randomised clinical trial: mucosal protection combined with acid suppression in the treatment of non-erosive reflux disease - efficacy of Esoxx, a hyaluronic acid-chondroitin sulphate based bioadhesive formulation. Aliment Pharmacol Ther 2017; 45(5):631-642.



ZIVEREL® tavaramerkin omistaa Norgine A/S

Sabora Pharma Oy • Puh. 029 3700 350 • info@sabora.fi • www.sabora.fi

Ziverell®

Närästyksen hoitoon

Suojaaa ruokatorven limakalvoa

Edistää limakalvon parantumista

Helpottaa nopeasti närästyksen oireita



Nopea vaikutus¹

Ziiverel[®]



SUOJAA

Hyaluronihapon ja kondroitiinisulfaatin yhdistelmä suojaa ruokatorven limakalvoa.

KORJAA

Hyaluronihappo osallistuu ruokatorven limakalvovaurioiden paranemiseen ja kondroitiinisulfaatti edistää limakalvon korjaantumista.

YLLÄPITÄÄ


Poloksameeri 407 pidentää hyaluronihapon ja kondroitiinisulfaatin suojaavaa vaikutusta vatsan erittämän suolahapon ja pepsiinin vaikutuksia vastaan ruokatorven seinämässä.

Mitä närästys on?


Närästysten aiheuttaa yleensä refluksitauti eli mahalaukun happaman sisällön pääsy ruokatorveen. Refluktaudin muita tunnusomaisia oireita ovat ärsytyskä ja äänihäiriöt. Närästys voimistuu runsaan syömisestä ja mahaa ärsyttävien ruokien (happamat mehut, kahvi, alkoholi) jälkeen. Refluktauti tavallisesti myös pahenee makuulla, joten oireet saattavat tuntua voimakkaammin öisin.

Perinteiset hoidot närästysten hoidossa pääasiassa vähentävät hapon määrää mahassa. Tämä ei aina riitä lievittämään oireita kokonaan.

ZIVEREL[®] + PPI hoidolla useamman potilaan närästykseksi tyypilliset oireet* helpottuivat kahden viikon hoitajakson aikana verrattuna plasebo+PPI hoitoon.²



Lisäämällä ZIVEREL[®] tavanomaisen närästyshoidon tueksi saavutettiin enemmän oireettomia potilaita¹



*Oireisiin sisältyi närästys, hapon nouseminen ruokatorveen, rintalastan kipu ja hapan maku suussa²

**Potilaiden tavanomainen PPI- ja H2-reseptoriantagonistien hoitoannos pidettiin molemmissa ryhmissä tutkimuksen aikana. Antacidit sallittiin tarpeen mukaan.¹

ZIVEREL[®] helpottaa närästysoireita 30 minuutissa.¹